

## SCHEMA

DIFFUSORE IDRO-  
REATTIVO AD AZIONE  
INSETTICIDA PER LA  
DISINFESTAZIONE DEGLI  
AMBIENTI

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

#### COMPOSIZIONE:

Cifenotrin puro 7.2g  
Coformulanti q.b. a 100 g  
(su 100g di prodotto  
contengono)

#### DOSI D'IMPIEGO:

Pulci, insetti volanti: 1 recipiente  
ogni 340-350 m<sup>3</sup>  
(100-135 m<sup>2</sup>)

Acari, insetti striscianti: 1  
recipiente ogni 110-140 m<sup>3</sup>  
(45-55 m<sup>2</sup>)

**VALIDITA'**: 2 anni

**Presidio medico-chirurgico  
Registrazione del ministero  
della salute n. 18936**

## INDICAZIONI

Fumigante ad azione insetticida facile da utilizzare, offre una grande sicurezza ed efficacia contro gli insetti volanti e striscianti, parassiti degli ambienti civili e domestici.

La diffusione delle micro-particelle insetticide, che avviene per idro-reazione, penetra in tutti gli anfratti. La sua azione è rapida e duratura nei confronti di parassiti ambientali, del legno, di moquettes, tappeti, abiti, ecc.

Il suo utilizzo è pratico e non necessita di alcuna preparazione; la diffusione avviene qualche minuto dopo la messa in azione.

A differenza dei diffusori tradizionali a gas o combustione, Dobol non provoca reazioni indesiderabili. La sua diffusione non provoca alcun danno quali che siano i locali trattati e gli oggetti presenti al loro interno (quadri, libri, tessuti, materiale elettrico o informatico, ecc).

Ad alte concentrazioni, il DOBOL può lasciare sulle superfici trattate un leggero strato di polvere che potrà essere facilmente rimosso alla fine del trattamento. Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi ambiente domestico e civile (case, alberghi, magazzini...).

### MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Portare fuori gli animali, compresi i pesci, e le piante fragili. Chiudere porte e finestre che danno sull'esterno. Aprire sportelli e cassette che si trovano nel locale da trattare.

Aprire la confezione rimuovendo la pellicola rossa ed estrarre il barattolo contenuto nella busta d'alluminio, porre il recipiente esterno in plastica in luogo adatto (ad esempio in mezzo ad una stanza, tra le due porte di un locale). Versare l'acqua fino all'altezza dei segni marcati sul recipiente in plastica, facendo attenzione a non superare il livello indicato, e porci il barattolo interno con il lato rosso verso l'alto. Non forare i buchi in plastica sulle parte superiore del barattolo. Lasciare il locale e chiudere le porte.

Nessuno deve essere presente nei locali durante la fumigazione e durante tutta la durata del trattamento.

La diffusione avviene dopo qualche minuto. In caso di uso simultaneo di più recipienti fumiganti, cominciare la messa in opera da quelli più lontani all'uscita. Lasciare agire nei locali chiusi preferibilmente per 4 ore o per un'intera giornata. Aerare brevemente prima di occupare nuovamente i locali.

### PRECAUZIONI:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non impiegare in agricoltura.

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, areare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.